

*Je nach Kulturart werden die Präparate zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr angewendet.
Hier erhalten Sie einen ersten Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten. Diese gehen über die Anforderung der Demeter-Richtlinien
hinaus: kundige Landwirte, Gärtner, Winzer, nutzen sie gezielt zum Erreichen einer optimalen Qualität.*



Saatbeetbereitung zur Einarbeitung der Stoppel oder eines Umbruches ➔ Sammelpräparat, präparierter Hornmist Aussaat wenige Tage vor bis nach der Aussaat ➔ Hornmistpräparat Wintergetreide im Herbst ab 3-Blatt-Stadium ➔ Hornkiesel Winter vor Kartoffel, Pilzkrankheiten gefährdeten Kulturen ➔ (3 x) Schachtelhalmpreparat	Frühentwicklung zum striegeln, hacken ➔ Hornmistpräparat (auch mehrmals) Hauptwachstumsphase bereits früh im Vegetativen ➔ erste Kieselspritzung Blüte/Fruchtbildung zur Unterstützung ➔ weitere Kieselspritzung Reife zur Förderung der Reife ➔ Kieselspritzung
---	--



Herbst
zur Förderung der Winterruhe
➔ **Sammelpräparat, präp. Hornmist**

Winter
sehr feuchte Flächen
➔ **(3 x) Schachtelhalmpräparat, auch auf gefrorenen Boden**

Frühjahr
zum Austrieb möglichst früh
➔ **Hornmist**

Schnitt/Beweidung
mind. 2 Wochen vor Nutzung
➔ **Hornkiesel**

Neuaufwiechs
nach Schnitt/Weide
➔ **Hornmist bzw. Hornkiesel wie zuvor**



Herbst
zur Förderung der Winterruhe, bei Laubfall
➡ **Sammelpreparat, präp. Hornmist**

Winter
bei Krankheitsgefährdung
(3 x) **Schachtelbalmpräparat,**
➡ **auch auf gefrorenen Boden**

Frühjahr
zum Austrieb möglichst früh
➡ **Hornmist (evtl. mit Baldrian)**

Vor-Blüte vor Blühbeginn
➡ **Hornkiesel**

Fruchtbildung, Reife
➡ **2. und 3. Kieselspritzung**

Nachernte
zur Ausreifung des Holzes
➡ **Hornkiesel**

[illegible]